





Cumberlandstraße 3/1

A – 1140 Wien

Tel. + 43 (0) 664 333 8423

E-mail : [arejzek@aon.at](mailto:arejzek@aon.at)



## Schamlippenverkleinerung

Der äußere weibliche Genitalbereich kann im Idealzustand als Muschel gesehen werden. Die vollen und straffen äußeren Schamlippen hüllen die Inneren ein. Durch die Schamlippen wird der Scheideneingang abgeschlossen und die Scheide vor Fremdkörpern, Austrocknung und dem Eindringen von Keimen geschützt. Sind die inneren Schamlippen zu groß und ragen über die Äußeren heraus, so ist diese Schutzfunktion nicht mehr voll gewährleistet.

Auch leiden viele Frauen durch Formveränderungen im äußeren Genitalbereich. Für viele Frauen stellen zu große innere Schamlippen auch eine tägliche Behinderung bei sportlicher Betätigung, wie Laufen, Reiten oder Radfahren dar. Durch eine Schamlippenverkleinerung kann der plastische Chirurg hier Abhilfe und Besserung schaffen.

Die Verkleinerung selbst ist ein relativ risikoarmer Eingriff, der durchaus ambulant und in Lokalanästhesie durchgeführt werden kann. Ziel des Eingriffes ist es, die inneren Schamlippen so zu verkleinern, dass diese durch die großen Schamlippen bedeckt werden. Ich lege mit der Patientin gemeinsam das Ausmaß der operativen Verkleinerung der Schamlippen fest. Liegen Größenunterschiede der inneren und äußeren Schamlippen vor, so wird die Größe derselben

**Operationsdauer** 1 Stunden

**Narkose** Vollnarkose,

**Klinikaufenthalt** 2 bis 3 Tage

**Fädenentfernung** Resorbierbares  
Nahtmaterial

**Gesellschaftsfähig** sofort

**Arbeitsfähig** nach 1 Woche

**Kostenübernahme durch  
die Krankenkasse** nein

angepasst. Es gibt durchaus unterschiedliche Operationsmethoden die Verkleinerung der Schamlippen betreffend. Bei der im obigen Bild dargestellten Methode wird je ein keilartiges Gewebestück entfernt und durch das Zusammennähen der beiden Teilstücke der Schamlippe erfolgt die angestrebte Straffung.